



Bundesamt
für Strahlenschutz

Bericht

Radioaktive Kontamination von Speisepilzen

(Stand: 2024, Messwerte 2021 bis 2023)

BfS-62/24

Eva Kabai
Alexander Hamer
Martin Steiner

Impressum

Bundesamt für Strahlenschutz
Postfach 10 01 49
38201 Salzgitter

Tel.: +49 30 18333-0
Fax: +49 30 18333-1885
E-Mail: ePost@bfs.de

www.bfs.de

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende URN:
[urn:nbn:de:0221-2024090245647](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0221-2024090245647)

August/2024

Inhalt

1	Zusammenfassung in Deutsch und Englisch.....	5
1.1	Zusammenfassung	5
1.2	Summary	5
2	Messprogramme des BfS zu Wildpilzen.....	7
3	Probenahme, Probenvorbereitung und Messung.....	9
4	Messergebnisse für ausgewählte Standorte in Süddeutschland	12
4.1	Cäsium-137	12
4.2	Langfristiger Verlauf der Cäsium-137-Kontamination	13
4.3	Zuchtpilze	13
4.4	Kalium-40	14
5	Vorhersagen für andere Standorte.....	15
6	Grenzwerte	17
7	Radiocäsiumaufnahme und Strahlenexposition	18
8	Wie werden sich die Cäsium-137-Aktivitäten von Speisepilzen in der Zukunft entwickeln?	21
9	Handlungsempfehlungen	22
	Literaturverzeichnis	23
	Anhang: Pilzfunde im Zeitraum 2021 bis 2023	25
	Anhang: Einstufung der Pilzarten (mykologische Beurteilung und Schutzstatus).....	36
	Anhang: Schülerproben aus der Region Bayerischer Wald	38
	Anhang: Messergebnisse des Jahres 2023	39
	Anhang: Messergebnisse des Jahres 2022	62
	Anhang: Messergebnisse des Jahres 2021	86
	Abkürzungsverzeichnis.....	105
	Abbildungsverzeichnis.....	106

Tabellenverzeichnis.....107

1 Zusammenfassung in Deutsch und Englisch

1.1 Zusammenfassung

Auch rund 38 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschornobyl (russisch Tschernobyl) können in manchen Teilen Bayerns erhöhte Aktivitäten des Radionuklids Cäsium-137 (Cs-137) in einigen Arten wild wachsender Speisepilze gemessen werden. Einige Pilzarten können noch bis zu einige tausend Becquerel (Bq) Cs-137 pro Kilogramm (kg) Frischmasse aufweisen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) untersucht seit 1987 die radioaktive Kontamination von Wildpilzen mit Radiocäsium im Süden Deutschlands. Dieses Gebiet wurde mit Aktivitätsablagerungen zwischen 2 000 und 50 000 Bq Cs-137 pro Quadratmeter sowie lokalen Spitzenwerten von 100 000 Bq Cs-137 pro Quadratmeter durch den Reaktorunfall von Tschornobyl besonders betroffen. Die Messwerte für Wildpilze variieren je nach Untersuchungsgebiet und Pilzart sehr stark. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 wurden insgesamt 160 Pilzarten untersucht.

Messwerte von über 1 000 Bq Cs-137 pro kg Frischmasse wurden im Zeitraum 2021 bis 2023 bei Semmelstoppelpilzen, Rotbraunen Semmelstoppelpilzen, verschiedenen Schnecklingsarten, Gelbstieligen Trompetenpfifferlingen, Maronenröhrlingen, Rotbraunen Scheidenstreiflingen, Seidigen Ritterlingen, Dickblättrigen Schwärztäublingen und Blassblauen Rötleritterlingen festgestellt.

Als Faustregel gilt, dass die Aufnahme von 80 000 Bq Cs-137 mit Lebensmitteln bei Erwachsenen zu einer Strahlenexposition von etwa 1 Millisievert (mSv) führt. Eine wöchentliche Mahlzeit während des ganzen Jahres mit 200 Gramm (g) Maronenröhrlingen mit 1 800 Bq Cs-137 pro kg Frischmasse (der Höchstwert in den letzten drei Jahren bei Maronenröhrlingen) führt beispielsweise zu einer zusätzlichen Strahlenexposition von etwa 0,23 mSv pro Jahr, man spricht dabei von einer Ingestionsdosis. Dies ist etwas mehr als ein Zehntel der durchschnittlichen Strahlenexposition aus natürlichen Quellen in Deutschland während eines Jahres (2,1 mSv).

Pilze, deren Cs-137-Gehalt 600 Bq pro kg Frischmasse überschreitet, dürfen in Deutschland nicht verkauft werden. Dieser Grenzwert gilt jedoch nicht für Pilze, die privat für den eigenen Verzehr gesammelt werden. Zugleich rät das BfS Pilzsammlern in den höher belasteten Gebieten Deutschlands, sich über den Cs-137-Gehalt wild wachsender Speisepilze zu informieren. Wer seine persönliche Strahlenexposition möglichst gering halten möchte, sollte auf den übermäßigen Verzehr selbst gesammelter, erfahrungsgemäß eher höher kontaminierter Wildpilzarten verzichten. Welche zusätzliche Strahlenexposition durch den Verzehr selbst gesammelter Pilze als akzeptabel betrachtet wird, ist letztlich eine persönliche Entscheidung.

Der jährlich veröffentlichte Bericht des BfS zur aktuellen Kontaminationslage bietet die Grundlage für eine informierte Entscheidung bezüglich des Verzehrs selbst gesammelter Wildpilze.

1.2 Summary

About 38 years after the Chernobyl reactor accident, elevated activity levels of the radionuclide cesium-137 (Cs-137) can be measured in some species of edible wild mushrooms in some parts of Bavaria. Some mushroom species can still contain up to a few thousand becquerels (Bq) Cs-137 per kilogram (kg) fresh mass.

The Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) has been investigating the radioactive contamination of wild mushrooms with radiocaesium in southern Germany since 1987. This area was heavily contaminated by the Chernobyl reactor accident, showing Cs-137 activity levels between 2,000 and 50,000 Bq per square meter and local hot spots with more than 100,000 Bq per square meter. The measured values for wild mushrooms vary greatly depending on sampling area and mushroom species. In the period between 2021 and 2023 in total 160 species of fungi were examined.

Measured values exceeding 1,000 Bq Cs-137 per kg fresh mass were detected in samples of *Hydnum repandum*, *Hydnum rufescens*, various *Hygrophorus* species, *Cantharellus tubaeformis*, *Imleria badia*, *Amanita fulva*, *Tricholoma columbetta*, *Russula nigricans* and *Lepista glaucocana* in the period from 2021 to 2023.

As a rule of thumb, the intake of 80,000 Bq Cs-137 via food results in a radiation exposure of adults of about 1 millisievert (mSv). A meal of 200 grams (g) of *Imleria badia* with 1,800 Bq Cs-137 per kg fresh mass (the highest activity measured in *Imleria badia* in the last three years) once a week throughout the whole year, for example, will cause an additional radiation exposure of about 0.23 mSv per year, referred to as ingestion dose. This is a little bit more than a tenth of the mean annual radiation exposure due to natural sources in Germany (2.1 mSv).

Mushrooms with Cs-137 levels exceeding 600 Bq per kg fresh mass are not allowed to be sold on the market in Germany. However, this limit does not apply to private mushroom pickers, who eat the mushrooms themselves. At the same time, the BfS advises mushroom pickers in more contaminated areas of Germany to get informed about the Cs-137 content of wild mushrooms. If one would like to keep the personal radiation exposure as low as possible, the regular consumption of self-collected wild mushroom species that are likely to show higher contamination levels from experience should be avoided. The acceptable additional radiation exposure from the consumption of self-collected mushrooms is ultimately a personal decision.

The annually published BfS report on the present contamination situation provides the basis for an informed decision regarding the consumption of self-picked mushrooms.

2 Messprogramme des BfS zu Wildpilzen


Pilze sind für viele Menschen eine beliebte Ergänzung des Speisezettels. Doch auch rund 38 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschornobyl werden in einigen Regionen Deutschlands in manchen Pilzarten erhöhte Aktivitäten des Radionuklids Cäsium-137 (Cs-137) gemessen. Semmelstoppelpilze, Rotbraune Semmelstoppelpilze, Elfenbeinschnecklinge und Gelbstielige Trompetenpfifferlinge aus dem Bayerischen Wald und aus dem Berchtesgadener Land können beispielsweise noch bis zu einige tausend Bq Cs-137 pro kg Frischmasse aufweisen.

Das BfS untersucht seit 1987 (bis 1989 als Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes) die radioaktive Kontamination von Wildpilzen mit Radiocäsium (Cs-137 und Cs-134) im Süden Deutschlands. Dieses Gebiet wurde mit Aktivitätsablagerungen zwischen 2 000 und 50 000 Bq Cs-137 pro Quadratmeter sowie lokalen Spitzenwerten von 100 000 Bq Cs-137 pro Quadratmeter durch den Reaktorunfall von Tschornobyl besonders betroffen. Während Cs-137 sowohl von den oberirdischen Kernwaffenversuchen als auch vom Reaktorunfall von Tschornobyl stammt, rührt Cs-134 ausschließlich vom Reaktorunfall her. Die spezifischen Aktivitäten bei Wildpilzen variierten je nach Untersuchungsgebiet und Pilzart sehr stark. Bei manchen Pilzarten fielen die spezifischen Aktivitäten schnell ab, während sie bei anderen Pilzarten anfänglich sogar anstiegen. Um verlässliche Prognosen zur zukünftigen Kontamination von Wildpilzen und anderen Nahrungsmitteln aus dem Wald zu ermöglichen, konzentrierte sich das BfS zunächst auf das Verständnis der Prozesse, die für die Dynamik von Radiocäsium in Waldökosystemen, insbesondere im Waldboden, verantwortlich sind. Das vertiefte Prozessverständnis war die Grundlage für die Entwicklung eines radioökologischen Modells zur Kontamination von Wildpilzen.


Für die wissenschaftlichen Untersuchungen spielte Cs-134 eine Schlüsselrolle. Cs-134 eignete sich gut, um dynamische Prozesse zu untersuchen, da das Zeitfenster, während dem Deutschland nach dem Reaktorunfall von Tschornobyl kontaminiert wurde, genau bekannt ist. Zudem ist das Isotopenverhältnis Cs-137/Cs-134 ein „Fingerabdruck“ für die verschiedenen Schichten (Horizonte) eines Waldbodens. Dies ermöglichte es, die Tiefenlage des Myzels (Pilzgeflecht) verschiedener Pilzarten im Waldboden zu bestimmen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Ein Wildpilz nimmt Radiocäsium aus der Schicht des Waldbodens auf, die sein Myzel durchzieht. Das BfS bestimmte für verschiedene Pilzarten die Lage des Myzels im Waldboden anhand des Isotopenverhältnisses Cs-137/Cs-134.
- Radiocäsium wandert langsam in tiefere Bodenschichten, wobei sich die Tiefenverteilung verbreitert.
- Wildpilze können je nach Art unterschiedlich stark Radiocäsium aus der vom Myzel durchzogenen Bodenschicht aufnehmen.

Wegen der vergleichsweise kurzen physikalischen Halbwertszeit von Cs-134 von rund 2 Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt der Untersuchungen des BfS nach rund 20 Jahren. Wissenschaftliche Fragestellungen, die auf Messungen von Cs-134 basierten, traten ab 2005 zugunsten eines umfangreichen Monitoringprogramms zur Kontamination wild wachsender Speisepilze mit dem langlebigen Radionuklid Cs-137 (physikalische Halbwertszeit rund 30 Jahre) in den Hintergrund. Die Messkampagnen ab 2005 umfassten sowohl Dauerprobeflächen als auch weitere typische Waldstandorte, die von Pilzsammlern aufgesucht werden. Die Probenahmeorte der letzten drei Jahre (2021 bis 2023) sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Bodenkontamination mit Cs-137 im Jahr 1986 ist in Abbildung 1 farblich gekennzeichnet. Das langlebige Radionuklid Cs-137 ist aufgrund seiner physikalischen Halbwertszeit von etwa 30 Jahren seitdem zu etwas mehr als der Hälfte zerfallen. Frühere Messdaten und die Messdaten für Standorte, die nicht mehr beprobt werden, können dem Bericht „Radioaktive Kontamination von Speisepilzen: Aktuelle Messwerte (Stand: 2018)“ aus dem Jahr 2019 entnommen werden (KABAI & POPPITZ-SPUHLER 2019).



Bodenkontamination mit Cs-137 im Jahr 1986 (Bq/m²):



1 Probenahmeorte im Rahmen des Pilzmessprogramms von 2020 bis heute: 1: Hochstadt; 2: Oberschleißheim; 3: Freising; 4: Siegenburg; 5: Aufham/Högl bei Anger; 6: Schneizreuth/Oberjettenberg; 7: Bayerisch Eisenstein; 8: Zwieseler Waldhaus/Nationalpark Bayerischer Wald.

3 Probenahme, Probenvorbereitung und Messung

An jedem dieser Standorte wurden die Fruchtkörper einer Spezies jeweils zu einer Probe vereinigt, die Frischmasse bestimmt und Probe sowie Standort dokumentiert. Die Probenahme entspricht damit weitgehend dem Verhalten eines privaten Pilzsammlers, der durch das Untersuchungsgebiet wandert. Die Pilzfunde an den ausgewählten Probenahmeorten im Zeitraum 2021 bis 2023 sind im Anhang in der Tabelle 1 dokumentiert. Insgesamt wurden 160 Pilzarten an acht Standorten beprobt. Abbildung 2 zeigt einige der Pilzfunde im Wald.



2 Maronenröhrling (*Imleria badia*, links) und Parasol / Riesenschirmpilz (*Macrolepiota procera*, rechts).

Die Pilzproben wurden im Labor bei 105 °C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet (siehe Abbildung 3), gemahlen, in kalibrierte Messgeometrien eingewogen und anschließend mit Reinstgermanium-Detektoren gammaspektrometrisch gemessen (siehe Abbildung 4). Eventuelle Restmengen werden als Rückstellproben gelagert, ebenso wie die gemessenen Proben. Der Arbeitsablauf ist in Abbildung 5 schematisch dargestellt.




3 Kleingeschnittene frische Pilzproben im Trockenschrank kurz vor der Trocknung.



4 Reinstgermanium-Detektor mit getrockneter und gemahlener Pilzprobe für die gammaspektrometrische Messung von Cs-137.

Im Rahmen der Qualitätssicherung werden bei den Reinstgermanium-Detektoren regelmäßig Energiekalibrierungen und Kalibrierungen des Nachweisvermögens (Efficiency) durchgeführt. Die Qualität der gammaspektrometrischen Messungen wird durch die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchsmessungen nachgewiesen. Sämtliche Messungen werden mithilfe aktueller Untergrundmessungen (Nulleffekt) korrigiert.



5 Schematische Darstellung der Probenvorbereitung, Messung und Auswertung.

4 Messergebnisse für ausgewählte Standorte in Süddeutschland

Die Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2023 sind in den Anhängen in den Tabellen 2023.1 bis 2021.7 zusammengestellt. Um eine breite Übersicht über die radioaktive Kontamination privat gesammelter Pilze in den höher belasteten Regionen Deutschlands zu ermöglichen, wurden alle Pilzarten untersucht, die traditionell von privaten Pilzsammlern verzehrt werden. Hierfür wurden nicht nur die klassischen Speisepilze berücksichtigt, sondern auch die hinsichtlich ihres Speisewertes uneinheitlich beurteilten Wildpilze, wie z. B. der Waldfreundröbling (*Gymnopus dryophilus*). Zudem wurden Pilzarten in die Tabellen aufgenommen, die nach Einschätzung eines vom BfS beauftragten Pilzexperten der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) nur in seltenen Fällen oder in großen Mengen unverträglich sind und von Pilzsammlern häufig verzehrt werden. Auch bei guten Speisepilzen können jedoch Allergien oder individuelle Unverträglichkeiten nicht ausgeschlossen werden (DGfM 2024a; MATZKE-HAJEK, HOFBAUER & LUDWIG 2017). Es wurden auch Pilzarten berücksichtigt, die auf der Roten Liste des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) stehen und zum Teil geschützt sind, wie der beliebte Fichtensteinpilz (*Boletus edulis*) oder der als gefährdet eingestufte Mohrenkopfmilchling (*Lactarius lignyotus*) (MATZKE-HAJEK, HOFBAUER & LUDWIG 2017). Gefährdete und geschützte Pilzarten sind in den Messergebnistabellen jedoch nur dann aufgeführt, wenn diese gemäß § 2 Abs. 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) in geringen Mengen für den Eigenbedarf aus dem Waldbestand entnommen werden dürfen (BARTSCHV 2005).

Die mykologische Beurteilung und der Schutzstatus der gemessenen Pilzarten sind in den Messergebnistabellen zusätzlich vermerkt. Hierbei bezeichnen das Kürzel S Speisepilzarten, das Kürzel G geschützte und gefährdete Speisepilzarten und das Kürzel U uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten. Bei geschützten und gefährdeten Speisepilzarten ist neben dem Kürzel G zusätzlich die Kategorie der Roten Liste des BfN angegeben. Pilzarten, die nach § 2 Abs. 1 BArtSchV geschützt sind und nur in geringen Mengen für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden dürfen, sind zudem mit dem Symbol § gekennzeichnet. Diese Informationskennzeichnung wurde bei allen gemessenen Pilzen durchgeführt. Eine ausführliche Erläuterung zur Kennzeichnung der mykologischen Beurteilung und des Schutzstatus ist im Anhang zu finden. Die wissenschaftlichen Namen entsprechen dem Stand vom April 2024.

Neben den Messwerten für Cs-137 sind in den Tabellen auch die Werte für das natürlich vorkommende Radionuklid Kalium-40 (K-40) aufgeführt. Alle Aktivitätsangaben beziehen sich auf die Frischmasse zum Zeitpunkt der Probenahme. Mehrfacheinträge für eine Pilzart an einem Probenahmeort innerhalb eines Kalenderjahres bedeuten, dass die betreffende Spezies zu verschiedenen Zeitpunkten in einem Kalenderjahr gesammelt wurde. Die durchschnittliche Messunsicherheit für Cs-137 lag bei etwa 5 %. Die Unsicherheiten wurden mit einem Konfidenzniveau von ungefähr 95 % und einem Erweiterungsfaktor von $k = 2$ berechnet.

4.1 Cäsium-137

Die Höhe der Cs-137-Kontamination schwankt je nach Pilzart und von Standort zu Standort erheblich. Spitzenwerte von über 4 000 Bq/kg Cs-137 wurden in Semmelstoppelpilzen (*Hydnum repandum*) und in Rotbraunen Semmelstoppelpilzen (*Hydnum rufescens*) gemessen.

Aktivitäten von mehr als 1 000 Bq/kg Cs-137 wurden in den letzten drei Jahren (2021 bis 2023) zudem in verschiedenen Schnecklingsarten, wie *Hygrophorus eburneus* und *Hygrophorus lucorum*, in Gelbstieligen Trompetenpfifferlingen (*Cantharellus tubaeformis* var. *lutescens*), in Maronentröhrlingen (*Imleria badia*), in Rotbraunen Scheidenstreiflingen (*Amanita fulva*), in Seidigen Ritterlingen (*Tricholoma columbetta*), in Dickblättrigen Schwärztäublingen (*Russula nigricans*) und in Blassblauen Rötleritterlingen (*Lepista glaucocana*) festgestellt.


Mit Messwerten stets unter 5 Bq/kg Cs-137 waren im gleichen Zeitraum z. B. folgende Arten nur gering kontaminiert: Braunschuppiger Riesenchampignon (*Agaricus augustus*), Dunkelfaseriger Champignon (*Agaricus fuscofibrillosus*), Hasentröhrling (*Gyroporus castaneus*), Judasohr (*Auricularia auricula-judae*) und Riesenporling (*Meripilus giganteus*). Proben, bei denen nur die Nachweisgrenze für Cs-137 ermittelt werden konnte, sind hier nicht aufgeführt.

Im Wesentlichen wurden typische Waldstandorte in Süddeutschland untersucht. In den am stärksten kontaminierten kleineren Gebieten im Bayerischen Wald, im Donaumoos südwestlich von Ingolstadt und in der Region Mittenwald (siehe Abbildung 1) sind die höchsten Radiocäsiumgehalte in Pilzen zu erwarten.

Im Rahmen eines vom BfS initiierten Forschungsvorhabens wurde im Bayerischen Wald in den Jahren 2002 bis 2004 bei Maronenröhrlingen (*Imleria badia*) ein Maximalwert von etwa 12 000 Bq/kg Cs-137 gemessen (FIELITZ 2005).

4.2 Langfristiger Verlauf der Cäsium-137-Kontamination

Der langfristige Verlauf der Cs-137-Kontamination wild wachsender Speisepilze ist in Abbildung 6 exemplarisch für Maronenröhrlinge (*Imleria badia*) und Ockertäublinge (*Russula ochroleuca*) aus dem Untersuchungsgebiet Hochstadt dargestellt. Aufgrund des radioaktiven Zerfalls von Cs-137 (physikalische Halbwertszeit rund 30 Jahre) wäre zwischen 1987 und 2017 ein Rückgang um rund 50 % zu erwarten. Tatsächlich verringerten sich die Messwerte wesentlich stärker. Dies ist auf die langsame Wanderung von Cs-137 in tiefere Schichten des Waldbodens zurückzuführen. Durch diese Tiefenverlagerung nahm die Kontamination der vom Myzel der jeweiligen Pilzart durchzogenen Bodenschicht ab.



6 Zeitlicher Verlauf der Cs-137-Kontamination von Maronenröhrlingen (*Imleria badia*) und Ockertäublingen (*Russula ochroleuca*) bezogen auf den Probenahmezeitpunkt und die Frischmasse (FM) für den Standort Hochstadt.

4.3 Zuchtpilze

Zuchtpilze, wie etwa der Zucht-Champignon (*Agaricus bisporus*), der Austernseitling (*Pleurotus ostreatus*) oder der Shiitake-Pilz (*Lentinula edodes*), werden auf speziellen Substraten angebaut. Zum Beispiel besteht das Kultursubstrat für Zucht-Champignons im Wesentlichen aus Pferdemist, Stroh, Hühnermist und geringen Mengen Gips und Kalk. Austernseitlinge werden auf Holz oder Stroh und Shiitake-Pilze auf Holz oder Sägemehl gezüchtet. Ähnlich wie bei Wildpilzen die Kontamination der vom Pilzmyzel durchzogenen Bodenschicht wichtig ist, wird der Cs-137-Gehalt von Zuchtpilzen durch die Kontamination des Kultursubstrats bestimmt. Kultursubstrate mit Bestandteilen aus dem landwirtschaftlichen Bereich (z. B. Stroh, Pferde- und Hühnermist) sind in der Regel nur gering mit Cs-137, Schwermetallen und anderen Schadstoffen belastet. Dementsprechend ist auch die Belastung der darauf angebauten Zuchtpilze nur gering. Solche Zuchtpilze sind ähnlich niedrig kontaminiert wie Lebensmittel aus landwirtschaftlicher


Produktion und können bedenkenlos verzehrt werden. Leicht erhöhte Gehalte von Cs-137 in Zuchtpilzen sind dann zu erwarten, wenn die Pilze auf kontaminiertem Holz angebaut werden.

4.4 Kalium-40

Das chemische Element Kalium (K) enthält von Natur aus immer 0,0117 % des natürlichen Radionuklids K-40. Ein Gramm Kalium enthält immer 31,6 Bq K-40. Der Gehalt an K-40 in Pilzen schwankt daher mit ihrem Kaliumgehalt. Die K-40-Aktivität der Pilzproben im Zeitraum 2021 bis 2023 reicht von 13 Bq/kg FM (0,41 g K pro kg FM) beim Judasohr (*Auricularia auricula-judae*) bis 670 Bq/kg FM (21 g K pro kg FM) beim Mehrräsling-Aggregat (*Clitopilus prunulus agg.*).

5 Vorhersagen für andere Standorte

Die Kontamination von Wildpilzen an Standorten, für die keine Messwerte vorliegen, lässt sich anhand der Karte zur Bodenkontamination mit Cs-137 (Abbildung 7) und den Messergebnissen des BfS näherungsweise ermitteln. Die Kontamination einer bestimmten Pilzart ist – bei gleichen ökologischen Bedingungen – umso höher, je höher die Kontamination des Waldbodens mit Cs-137 pro Fläche ist. Ist beispielsweise die Aktivität von Cs-137 pro Fläche nur halb so hoch, so ist auch nur die Hälfte der spezifischen Aktivität der betreffenden Pilzart zu erwarten.




7 Bodenkontamination mit Cs-137 im Jahr 1986.

Hierzu ein Beispiel: Das Untersuchungsgebiet Hochstadt (Oberbrunner Holz) etwa 25 km westsüdwestlich von München weist mit 14 000 Bq/m² im Jahr 1986 eine Kontamination auf, die für die Gebiete südlich der Donau typisch ist. Die vom BfS in diesem Gebiet gemessene Aktivität betrug für den Habichtspilz (*Sarcodon imbricatus*) 280 Bq Cs-137 pro kg Frischmasse im Jahr 2021. Angenommen, eine Familie interessiert sich für ein Waldgebiet, für das keine Messwerte zum Habichtspilz vorliegen. Die Karte zur Bodenkontamination

mit Cs-137 weist für dieses Waldgebiet eine Kontamination von 30 000 Bq/m² im Jahr 1986 aus. Bei ähnlichen ökologischen Bedingungen ist dann im Jahr 2024 – wie im Jahr 2021 – für den Habichtspilz in diesem Waldgebiet ein Messwert von rund 600 Bq Cs-137 pro kg Frischmasse zu erwarten. Da der Radiocäsiumgehalt einer Pilzart selbst innerhalb kleiner Waldgebiete im Allgemeinen wesentlich stärker schwankt als von Jahr zu Jahr (siehe Abbildung 8), können die Messergebnisse des BfS aus den Vorjahren für diese Abschätzung herangezogen werden.

Unter den vom BfS untersuchten Waldgebieten weist der Standort Siegenburg, der durch unter Naturschutz stehende Binnendünen geprägt ist, außergewöhnliche ökologische Bedingungen auf. Messdaten dieses Standorts können nur auf andere Binnendünengebiete, nicht aber auf nahegelegene Waldgebiete mit anderen ökologischen Charakteristika übertragen werden.

Ergänzend sei erwähnt, dass die Karte zur Bodenkontamination mit Cs-137 in Deutschland (Abbildung 1 oder 7) die heutigen Verhältnisse sehr gut wiedergibt, wenn man die angegebenen Zahlenwerte mit dem Faktor 0,41 multipliziert. Die Kontaminationskarte bezieht sich auf das Jahr 1986. Wegen seiner physikalischen Halbwertszeit von rund 30 Jahren ist Cs-137 seither um etwas mehr als die Hälfte zerfallen.



8 Variabilität der Kontamination von Semmelstoppelpilzen (*Hydnum repandum*) am Standort Aufham im Zeitraum 2017 bis 2023.

6 Grenzwerte

Speisepilze, deren Cs-137-Gehalt den Grenzwert von 600 Bq pro kg Frischmasse (Bq/kg FM) überschreitet, dürfen weder in die Europäische Union eingeführt (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2020) noch innerhalb Deutschlands „in Verkehr gebracht“, d. h. verkauft werden. Die Einhaltung dieses Grenzwertes wird von der amtlichen Lebensmittelüberwachung stichprobenartig kontrolliert. Wer Wildpilze aus dem Handel bezieht, kann also darauf vertrauen, dass der Grenzwert nicht überschritten wird.

Für Pilzsammler, die Wildpilze selbst verzehren, gilt dieser Grenzwert jedoch nicht. Umso wichtiger ist es für diesen Personenkreis, sich über die zu erwartende Strahlenexposition zu informieren. Der jährlich aktualisierte Bericht des BfS zur radioaktiven Kontamination von Speisepilzen erlaubt es allen Pilzsammlern, ihre individuelle Strahlenexposition durch den Verzehr von Wildpilzen abzuschätzen.

7 Radiocäsiumaufnahme und Strahlenexposition

In Deutschland werden mit Nahrungsmitteln aus landwirtschaftlicher Erzeugung im Mittel weniger als 100 Bq Cs-137 pro Person und Jahr aufgenommen (BMU 2022). Gegenwärtig kann mit einer Mahlzeit höher kontaminierter Speisepilze somit mehr Cs-137 zugeführt werden als mit Lebensmitteln aus landwirtschaftlicher Produktion während eines ganzen Jahres.

Cs-137 verhält sich im menschlichen Körper ähnlich wie Kalium. Es wird im Magen-Darm-Trakt fast vollständig resorbiert und im Körper annähernd gleichmäßig verteilt. Ein kleiner Teil des inkorporierten Cs-137 wird relativ rasch, der überwiegende Teil jedoch wesentlich langsamer wieder ausgeschieden (biologische Halbwertszeit 45-150 Tage, vereinzelt bis zu 200 Tage) (ICRP 2017).



Als Beispiele für den zeitlichen Verlauf der Gesamtaktivität im menschlichen Körper (Ganzkörperaktivität) sind in Abbildung 9 die Messwerte zweier Personen mit durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten dargestellt, die gelegentlich auch Wildpilzmahlzeiten zu sich nehmen. Die beiden Personen sind während der letzten Jahre regelmäßig am Ganzkörperzähler des BfS in Neuherberg gemessen worden (INKORPORATIONSMESSSTELLE 2020). Die Symbole (Punkte) zeigen die gemessenen Ganzkörperaktivitäten an den verschiedenen Messtagen. Die durchgezogenen Linien geben die durch Anpassung (Fit) an die Messdaten abgeschätzten zeitlichen Gesamtaktivitätsverläufe wieder. Die personenbezogenen Modellparameter sind die individuelle Cs-137-Aktivität, die täglich mit Lebensmitteln aus landwirtschaftlicher Erzeugung aufgenommen wird, die individuelle Cs-137-Aktivität, die jeweils bei einer Pilzmahlzeit aufgenommen wird, sowie der individuelle Wert für die biologische Halbwertszeit von Cs-137.

Wichtig für die Beurteilung des Radiocäsiumgehalts wild wachsender Speisepilze ist die Höhe der zusätzlichen Strahlenexposition (effektive Dosis in der Einheit Millisievert, mSv), die sich aus dem Verzehr dieser Pilze für den Menschen ergibt. Sie hängt von der gesamten Cs-137-Aktivität ab, die mit Speisepilzen aufgenommen wird, egal, ob die insgesamt aufgenommene Aktivität von vielen Mahlzeiten gering kontaminierter Pilze oder von nur einer Mahlzeit mit hoch kontaminierten Pilzen herrührt. Dosimetrische Modellrechnungen ergeben, dass die Aufnahme von 1 Bq Cs-137 bei Erwachsenen zu einer effektiven Dosis von $1,3E-08$ Sv führt. Mit anderen Worten: Der Dosiskoeffizient für die Ingestion von Cs-137 beträgt bei Erwachsenen $1,3E-08$ Sv/Bq. Die Aufnahme von 80 000 Bq Cs-137 mit Lebensmitteln entspricht bei Erwachsenen somit einer Strahlenexposition von etwa 1 mSv.

Einen Eindruck von der Höhe der Strahlenexposition vermittelt folgendes Beispiel: Verzehrt ein Erwachsener während eines Kalenderjahres 50 Pilzmahlzeiten mit je 200 g Maronenröhrlingen, die eine spezifische Aktivität von 1 800 Bq/kg Cs-137 aufweisen, führt dies zu einer Aufnahme von 18 000 Bq Cs-137 und damit zu einer zusätzlichen effektiven Dosis von 0,23 mSv. Ein Vergleichsmaßstab ist die Strahlenexposition aus natürlichen Quellen in Deutschland, die im Mittel 2,1 mSv pro Jahr beträgt und je nach örtlichen Gegebenheiten, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zwischen 1 und 10 mSv pro Jahr variieren kann.

Welche zusätzliche Strahlenexposition durch den Verzehr selbst gesammelter Pilze als akzeptabel betrachtet wird, ist letztlich eine persönliche Entscheidung. Handlungsempfehlungen sind in Kapitel 9 zusammengestellt.

Bei regelmäßigem Wildpilzverzehr sollte auch aus anderen Gründen eine Menge von 200 bis 250 g Wildpilze pro Woche nicht überschritten werden (BMUV 2022): Sie können Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Cadmium anreichern.



9 Zeitlicher Verlauf der Ganzkörperaktivitäten (Cs-137) zweier Personen mit durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten und gelegentlichem Pilzverzehr (INKORPORATIONSMESSSTELLE 2020). Einzelheiten sind im Text beschrieben.

Ergänzend sei erwähnt, dass der Gehalt von natürlich vorkommendem K-40 in Speisepilzen – wie bei allen anderen Nahrungsmitteln auch – zu keiner zusätzlichen Strahlenexposition des Menschen führt. Das natürlich vorkommende K-40 steht in einem festen Verhältnis zu den stabilen Kalium-Isotopen. Da der menschliche Körper seinen Kaliumgehalt regelt, bleibt auch der Gehalt von K-40 annähernd konstant. Je nach Alter, Geschlecht und anderen Faktoren liegt die Kalium-40-Aktivität des menschlichen Körpers etwa zwischen 40 und 60 Bq pro kg Körpergewicht. Die effektive Dosis durch K-40 liegt im Mittel bei 0,165 mSv pro Jahr für Erwachsene und 0,185 mSv pro Jahr für Kinder. Die in den Messergebnistabellen aufgeführten spezifischen Aktivitäten von K-40 sind aus Sicht des Strahlenschutzes ohne Bedeutung.

8 Wie werden sich die Cäsium-137-Aktivitäten von Speisepilzen in der Zukunft entwickeln?

Die radioaktive Kontamination der Pilze hängt sowohl vom Radiocäsiumgehalt der vom Pilzgeflecht (Myzel) durchzogenen Bodenschicht als auch vom speziellen Anreicherungsvermögen der jeweiligen Pilzart ab:


- Die langsame Verlagerung von Radiocäsium in tiefere Bodenschichten führte bei Pilzarten mit einem oberflächennahen Myzel, wie zum Beispiel dem Butterrübling (*Rhodocollybia butyracea*), zu einem raschen Abfall der Kontamination (STEINER 1999).
- Bei Spezies mit einem tief liegenden Myzel, wie zum Beispiel dem Frauentäubling (*Russula cyanoxantha*), wurden nach dem Reaktorunfall von Tschornobyl anfänglich ansteigende Messwerte beobachtet, da sich Radiocäsium in diesen Schichten zunächst anreicherte (STEINER 1999).

In Zukunft ist zu erwarten, dass bei Wildpilzen in der Regel weiter langsam abnehmende Radiocäsiumaktivitäten gemessen werden. Eine genauere Prognose ist nur möglich, wenn die ökologischen Bedingungen des jeweiligen Standortes bekannt sind. Schlüsselfaktoren sind die Dynamik der Tiefenverlagerung von Radiocäsium im Waldboden sowie die Lage des Myzels der betrachteten Pilzart im Waldboden.

9 Handlungsempfehlungen

Pilzarten, die in den letzten drei Jahren spezifische Aktivitäten von über 1 000 Bq/kg Cs-137 aufwiesen, sind in Unterkapitel 4.1 aufgelistet und in den Tabellen im Anhang durch Fettdruck hervorgehoben.

Derart hohe Aktivitäten in Wildpilzen sind nur in den höher belasteten Gebieten Deutschlands, wie dem Bayerischen Wald, dem Alpenrand und dem Donaumoos südwestlich von Ingolstadt zu erwarten (siehe auch Abbildungen 1 und 7). Abbildung 10 zeigt beispielhaft die Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten höher kontaminierter Wildpilze an den Standorten Aufham/Högl und Oberjettenberg während der letzten neun Jahre (2015 bis 2023).



10 Spezifische Aktivitäten höher kontaminierter Wildpilze (als Jahresmittelwerte) an den Standorten Aufham/Högl und Oberjettenberg während der letzten neun Jahre (2015 bis 2023).

Ein Pilzsammler, der sich an der empfohlenen maximalen Verzehrsmenge von 200 bis 250 g pro Woche orientiert (BMUV 2022) und pro Jahr 13 kg Wildpilze mit einer spezifischen Aktivität von 1 000 Bq/kg Cs-137 verzehrt, erfährt eine zusätzliche Strahlenexposition von rund 0,17 mSv pro Jahr. Dies entspricht rechnerisch in etwa der zusätzlichen Strahlenexposition durch Höhenstrahlung bei drei Flügen von Frankfurt nach New York.

Eine Vorhersage der Kontamination im Jahr 2024 für einzelne Pilzarten an einzelnen Orten ist aus den dargelegten Gründen nicht möglich. Gute Anhaltspunkte sind jedoch die Messwerte aus den Vorjahren an den vom BfS untersuchten Standorten sowie das in Kapitel 5 beschriebene Vorgehen für andere Standorte. Für die hier dargestellten, in den letzten Jahren höher kontaminierten Pilzarten rät das BfS Pilzsammlern, in den höher belasteten Gebieten Deutschlands auf den übermäßigen Verzehr selbst gesammelter Wildpilze zu verzichten.

Literaturverzeichnis

- [1] BARTSCHV (2005): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV).
https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/anlage_1.html
- [2] BMU (2022): Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2019, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2022041232235>
- [3] BMUV (2022): Verbrauchertipps Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stand September 2022, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
<https://www.bmu.de/themen/gesundheit-chemikalien/gesundheit/lebensmittelsicherheit/verbrauchertipp#c15512>
- [4] BNATSchG (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG).
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html#BJNR254210009BJNG000100000
- [5] DGFM (2024a): Deutsche Gesellschaft für Mykologie, Fachausschuss Pilzverwertung und Toxikologie. Positivliste der Speisepilze (Stand 21.01.2024).
<https://www.dgfm-ev.de/pilzesammeln-und-vergiftungen/speisepilze/wildpilze>
- [6] DGFM (2024b): Deutsche Gesellschaft für Mykologie, Fachausschuss Pilzverwertung und Toxikologie. Pilze mit uneinheitlich beurteiltem Speisewert (Stand 21.01.2024).
<https://www.dgfm-ev.de/pilzesammeln-und-vergiftungen/speisepilze/wildpilze>
- [7] EUROPÄISCHE KOMMISSION (2020): Durchführungsverordnung (EU) 2020/1158 der Kommission vom 5. August 2020 über die Einfuhrbedingungen für Lebens- und Futtermittel mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1158&from=DE>
- [8] FIELITZ, U. (2005): Untersuchungen zum Verhalten von Radiocäsium in Wildschweinen und anderen Biomedien des Waldes, Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben St.Sch. 4324, Bundesamt für Strahlenschutz.
<https://www.bmu.de/download/bmu-2005-675-untersuchungen-zum-verhalten-von-radiocaesium-in-wildschweinen-und-anderen-biomedien-des-waldes>
- [9] ICRP (2017): International Commission on Radiological Protection (ICRP): Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3, ICRP Publication 137, Annals of the ICRP, Vol. 46, No. 3/4.
- [10] INKORPORATIONSMESSSTELLE (2020): Inkorporationsmessstelle Neuherberg: Jahresbericht 2019, Bundesamt für Strahlenschutz, BfS-Bericht BfS-28/20.
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2020040121400>
- [11] KABAI, E.; POPPITZ-SPUHLER, A. (2019): Radioaktive Kontamination von Speisepilzen: Aktuelle Messwerte (Stand: 2018), Bundesamt für Strahlenschutz.
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2019100719400>
- [12] MATZKE-HAJEK, G.; HOFBAUER, N. & LUDWIG G. (Red.) (2017): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 70 (8): Pilze (Teil 1) – Großpilze, Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg. ISBN 978-3-7843-5454-5.

[13]STEINER, M. et al. (1999): Model for predicting the long-term radiocesium contamination of mushrooms, S. 195-201 in: Contaminated Forests (Hrsg. I. Linkov und W. R. Schell), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.

Anhang: Pilzfunde im Zeitraum 2021 bis 2023

Tabelle 1: Funde einzelner Pilzarten an den ausgewählten Probenahmeorten im Zeitraum 2021 bis 2023

Fett markiert sind Pilzarten, für die die obenstehenden kompakten Handlungsempfehlungen des BfS gelten.

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlreuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Amethystpfifferling	X		X				X	X
Anisklumpfuß						X		
Apfeltäubling				X				
Ästiger Stachelbart								X
Austerseitling							X	X
Bereifter Rotfußröhrling	X			X		X	X	X
Beutelstäubling	X					X		
Birnenstäubling			X		X	X		
Blassblauer Rötleritterling		X			X	X		
Blaublättriger Schleimfuß						X	X	
Blauer Träuschling					X	X		
Blaustiel-Schleimfuß							X	
Blutroter Filzröhrling			X					
Brauner Büschelrasling	X		X					

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Brauner Kiefern-Blutreizker				X				
Braunroter Lacktrichterling				X				
Braunroter Ledertäubling			X					
Braunschuppiger Riesenchampignon		X						
Breitblättrige Glucke (Tannenglucke)					X		X	X
Breitblättriger Rübbling			X		X	X	X	X
Buckeltäubling		X		X	X			
Butterrübbling	X		X			X	X	X
Dichtblättriger Schwarztäubling	X				X	X	X	X
Dickblättriger Schwärztäubling	X	X	X		X	X	X	X
Duftender Leistling					X	X		
Dunkelfaseriger Champignon	X	X						
Dunkelscheibiger Schneckling					X	X		
Dunkler Hallimasch	X		X	X	X	X	X	X
Düsterer Porphyrröhrling							X	X
Echter Knoblauchschildling								X

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizreuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Echter Reizker		X		X		X		
Elfenbeinschneckling			X		X	X		X
Espen-Rotkappe	X	X			X			X
Falscher Pfifferling							X	
Faltentintling			X		X	X		
Fichtenreizker	X	X	X	X	X	X	X	X
Fichtensteinpilz	X	X	X	X	X		X	X
Flaschenstäubling	X	X	X		X	X	X	X
Fleischroter Gallertrichterling	X				X	X		
Flockenstieler Hexenröhrling	X	X	X	X	X		X	X
Fransiger Wulstling		X						
Frauentäubling	X		X		X	X	X	X
Fuchsiger Rötelritterling	X	X	X					
Gelbstieliger Muschelseitling			X		X			
Gelbstieliger Trompetenpfifferling	X		X		X		X	X
Gemeiner Birkenpilz	X				X		X	X

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Gemeiner Lacktrichterling					X			
Gemeiner Rotfußröhrling	X		X	X	X		X	X
Gemeiner Weißtäubling		X			X	X	X	X
Gewöhnliche Wurzeltrüffel				X				
Goldröhrling			X		X	X		
Gold-Täubling					X			
Grasgrüner Birken-Täubling								X
Graublättriger Erdritterling					X	X		
Graublättriger Schwefelkopf			X	X	X	X		X
Grauer Lärchenröhrling					X	X		
Grauer Leistling					X			
Grauer Scheidenstreifling	X							
Grauer Wulstling	X		X		X		X	X
Grüner Nadelwald-Heringstäubling					X			
Habichtspilz	X			X	X	X		X
Hainbuchen-Raufuß					X			

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Harter Pappel-Raufußröhrling					X			
Hasenröhrling			X					
Hohlfußröhrling					X			
Honiggelber Hallimasch	X				X	X		
Horngrauer Butterrübling					X			
Isabellfarbener Schneckling						X		
Jodoform-Täubling			X	X			X	
Judasohr					X			
Kaffeebrauner Gabeltrichterling					X			
Keulenfüßiger Trichterling				X				
Knopfstieliger Rübling		X	X		X		X	
Körnchenröhrling						X		
Krause Glucke, Fette Henne			X					
Kuhmaul		X	X		X	X		
Kuhröhrling					X	X		
Kupferroter Gelbfuß	X	X			X	X		

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Kurzstieliger Weichritterling					X			
Lachsblättriger Schwarztäubling					X			
Lachsreizker					X	X	X	X
Lärchenmilchling			X		X			
Lärchen-Schneckling					X	X		
Lederstieltäubling	X	X			X	X		
Lungen-Seitling								X
Maronenröhrling	X	X	X	X	X		X	X
Mausgrauer Erdritterling						X		
Mehlräsling					X	X		X
Mehlräsling-Aggregat					X			
Milder Glanztäubling					X			
Milder Milchling			X					
Mohrenkopfmilchling					X		X	X
Mönchskopf					X			
Nebeltrichterling, Nebelkappe	X	X	X		X	X	X	

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizreuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Netzstieliger Hexenröhrling	X		X		X	X		
Ockerbrauner Trichterling		X	X					
Ockertäubling	X		X	X	X		X	X
Olivbrauner Milchling						X		
Orangegelber Lärchen-Schneckling					X			
Panzer-Rasling			X		X			
Parasol / Riesenschirmpilz	X	X	X	X	X			
Perlpilz	X	X	X	X	X	X	X	X
Pfefferröhrling					X			
Pfifferling						X	X	X
Punktierstieliger Schneckling					X			
Purpurschwarzer Täubling			X					
Rehbrauner Dachpilz			X		X		X	X
Reifpilz				X				
Riesenporling			X					X
Rosenroter Schmierling						X		

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Rostbrauner Filzröhrling					X			
Rostroter Lärchenröhrling				X	X	X		
Rotbrauner Scheidenstreifling							X	
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	X	X			X	X	X	X
Roter Heringstäubling		X				X		
Rötlicher Holzritterling		X	X	X	X	X		
Rötlicher Lacktrichterling	X		X		X		X	X
Rotstieliger Ledertäubling					X			
Safran-Riesenschirmling	X	X	X					
Samtfußkrempling	X		X		X			
Samt-Pfifferling								X
Schiefknolliger Anischampignon			X		X			
Schleiereule					X			
Schmalblättriger Weißtäubling		X	X					X
Schmutziger Röteltrichterling					X			
Schopftintling	X		X		X			

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizreuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Schwarzfaseriger Ritterling				X	X			
Schwefelporling								X
Seidiger Ritterling								X
Semmelstoppelpilz		X			X	X	X	X
Sommersteinpilz					X	X		
Spangrüner Kiefern-Reizker				X				
Speise-Täubling					X		X	X
Stadtchampignon			X		X			
Sternschuppiger Riesenschirmling			X					
Stockschwämmchen	X		X		X		X	X
Strubbelkopfröhrling			X					X
Totentrompete								X
Trockener Schneckling								X
Trompetenpfeifferling				X	X		X	X
Veilchenrötelritterling		X			X			
Violetter Lacktrichterling	X		X	X	X		X	X

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizlireuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Violetter Rötelritterling	X		X		X			
Violetter Schleierling	X		X			X		X
Violetttrandiger Schleimkopf						X		
Violettstieliger Pfirsichtäubling			X					
Waldchampignon	X				X			
Waldfreundröbling					X	X		
Wandelbarer Hallimasch	X		X			X	X	X
Wässriger Saumpilz			X					
Weißer Büschelrasling					X			
Wohlriechender Schneckling					X			
Wolliger Milchling							X	X
Würziger Tellerling					X			
Ziegelgelber Schleimkopf	X	X			X	X		
Ziegenlippe					X			
Zitterzahn							X	
Zweifarbiger Scheidenstreifling	X						X	

	Ort 1: Hochstadt	Ort 2: Oberschleißheim	Ort 3: Freising	Ort 4: Siegenburg	Ort 5: Aufham/Högl	Ort 6: Schneizreuth/Oberjettenberg	Ort 7: Bayerisch Eisenstein	Ort 8: Zwieseler Waldhaus/ Nationalpark Bayerischer Wald
Zwiebelfüßiger Hallimasch		X						
Zystiden-Räsling	X							

Anhang: Einstufung der Pilzarten (mykologische Beurteilung und Schutzstatus)

Wie in Kapitel 4 erwähnt, wurden die gemessenen Pilzarten hinsichtlich ihrer mykologischen Bewertung und ihres Schutzstatus in verschiedene Kategorien eingeteilt (siehe Tabelle 2). Diese Einstufungen geben die Bewertung des Fachausschusses Pilzverwertung und Toxikologie der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) wieder.

Tabelle 2: Einstufung der Speisepilzarten.

Einstufung	Erläuterung	Referenz/Literatur
Einstufung S	Gängige Speisepilzarten – Keine Unterkategorien	Positivliste DGfM (DGFM 2024a), Beurteilung des mykologischen Sachverständigen der DGfM
Einstufung G	Geschützte und gefährdete Speisepilzarten – Unterteilt in Kategorien der Roten Liste mit zusätzlichen Unterkategorien	Positivliste DGfM (DGFM 2024a), Liste der DGfM mit uneinheitlich beurteiltem Speisewert (DGFM 2024b), Rote Liste BfN (MATZKE-HAJEK, HOFBAUER & LUDWIG 2017), BArtSchV (BARTSCHV 2005), BNatSchG (BNATSCHG 2009)
Einstufung U	Uneinheitlich beurteilte Speisepilze – Keine Unterkategorien, keine gängigen Speisepilzarten	Liste der DGfM mit uneinheitlich beurteiltem Speisewert (DGFM 2024b), Beurteilung des mykologischen Sachverständigen der DGfM

Die Einstufung S führt alle Speisepilze auf, die in der Positivliste der DGfM (Stand 21.01.2024) aufgeführt werden, und die Speisepilze, die nicht in der Positivliste sind, aber laut DGfM-Fachausschuss Pilzverwertung und Toxikologie als gut essbar eingestuft werden.

Die Einstufung G beinhaltet alle gefährdeten und geschützten Pilzarten, die während der Probenahme erfasst wurden. Keine Proben genommen wurden von streng geschützten Pilzarten nach Kategorie RL 1 der Roten Liste (Pilzarten, die vom Aussterben bedroht sind) und besonders geschützten Pilzarten, die gemäß § 1 Satz 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ohne Ausnahme geschützt sind. Darunter fallen beispielsweise Trüffel, aber auch Pilze, wie der Schafporling (*Albatrellus ovinus*).

Die geschützten und gefährdeten Speisepilzarten sind neben dem Kürzel G zusätzlich mit den Abkürzungen der Rote-Liste-Kategorien und/oder dem Paragrafensymbol (§) gekennzeichnet. Die Rote-Liste-Kategorien sollen die Gefährdungssituation leicht verständlich und in komprimierter Form widerspiegeln. Damit dienen sie der übersichtlichen Darstellung von Handlungsprioritäten im Naturschutz.

Die Rote-Liste-Kategorien des BfN in Deutschland sind:

- G – RL V = Rote Liste Kategorie V (Vorwarnliste)
- G – RL R = Rote Liste Kategorie R (extrem selten)
- G – RL G = Rote Liste Kategorie G (Gefährdung unbekanntes Ausmaßes)
- G – RL 3 = Rote Liste Kategorie 3 (gefährdet)
- G – RL 2 = Rote Liste Kategorie 2 (stark gefährdet)


Geschützte Pilzarten, die mit dem Paragrafensymbol (§) gekennzeichnet sind, sind Pilzarten, die gemäß § 2 Abs. 1 BArtSchV geschützt sind und nur mit Ausnahmen, in geringen Mengen für den eigenen Bedarf, der Natur entnommen werden dürfen. Bei der Kennzeichnung der Pilzarten werden folgende Varianten unterschieden:

- G – RL 3 § = Rote Liste Kategorie 3 (gefährdet) und geschützt gemäß § 2 Abs. 1 BArtSchV
- G – § = Geschützt gemäß § 2 Abs. 1 BArtSchV, es dürfen jedoch geringe Mengen für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden.

Das Kürzel U beschreibt alle Speisepilze, die in der Liste der DGfM mit uneinheitlich bewerteten Speisepilzen (Stand 21.01.2024) aufgeführt sind und laut DGfM-Fachausschuss Pilzverwertung und Toxikologie als nur bedingt essbar oder als unverträglich eingestuft wurden.

Anhang: Schülerproben aus der Region Bayerischer Wald

Im Schuljahr 2023/2024 sammelte eine Klasse des Gymnasiums Zwiesel (Region Bayerischer Wald) im Rahmen eines Projektseminars Proben von Pilzen in ihrer Umgebung. Diese Proben wurden dem BfS zur Verfügung gestellt, um die radioaktive Kontamination der gesammelten Pilze zu untersuchen. Abbildung 11 zeigt exemplarisch für Maronenröhrlinge (*Imleria badia*) die Probenahmeorte und die gemessenen Cs-137-Gehalte in Bq/kg Frischmasse (FM). Die Kartendarstellung belegt, dass für dieselbe Pilzart (Maronenröhrling) die regionalen Unterschiede erheblich sein können. Das BfS bedankt sich bei der Schulklasse und dem Leiter des Projektseminars Herrn Loibl, Gymnasium Zwiesel, für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit die Daten zu verwenden.



11 Probenahmeorte der Maronenröhrlinge (*Imleria badia*) mit der jeweiligen Cs-137-Kontamination in Bq/kg FM als blaue Balken. Probenahmeorte von Nord nach Süd: Bayerisch Eisenstein, Oberfrauenau, Frauenau, Zimmerau, Schönanger, Hintberg und Lalling. Quellen: Cs-137-Kontaminationswerte von BfS, Kartendaten von OpenStreetMap.

Anhang: Messergebnisse des Jahres 2023

Tabelle 2023.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Beutelstäubling	<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	1,2	110	S
Brauner Büschelrasling	<i>Lyophyllum decastes</i>	63	100	S
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	300	120	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	100	110	U
		800	140	
Dunkelfaseriger Champignon	<i>Agaricus fuscofibrillosus</i>	2,3	420	S
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	13	140	U
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	5,3	130	G-§
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	68	100	S
		140	59	
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	60	100	G-§
Flockenstieliger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	93	44	S
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	150	160	S
Gemeiner Birkenpilz	<i>Leccinum scabrum s.l.</i>	270	330	G-§
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	910	290	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	50	120	S
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	210	170	G-RL 3
Honiggelber Hallimasch	<i>Armillaria mellea s.l.</i>	2,2	94	U
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	430	110	S
		460	92	
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	9,0	91	S
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	320	140	U
		370	210	
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	10	310	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	110	96	S
		220	84	
Samtfußkrempling	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	27	64	U
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,4	100	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	4,6	47	S
Waldchampignon	<i>Agaricus sylvaticus</i>	53	230	S
Zweifarbiger Scheidenstreifling	<i>Amanita umbrinolutea</i>	58	200	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Blassblauer Rötleritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	62	180	S
Braunschuppiger Riesenchampignon	<i>Agaricus augustus</i>	0,6	120	S
Buckeltäubling	<i>Russula caerulea</i>	44	120	U
		120	220	
Dickblättriger Schwärztäubling	<i>Russula nigricans</i>	260	110	U
Dunkelfaseriger Champignon	<i>Agaricus fuscofibrillosus</i>	0,4	170	S
		1,1	170	
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	47	140	G-§
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	79	150	S
Flockenstieler Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	81	260	S
Fransiger Wulstling	<i>Amanita strobiliformis</i>	0,9	130	S
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	2,8	120	S
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	6,1	110	U
Kuhmaul	<i>Gomphidius glutinosus</i>	220	220	S
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	66	100	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	200	87	S
		370	180	
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	4,6	82	U
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	2,2	160	S
		5,0	120	
Roter Heringstäubling	<i>Russula xerampelina</i>	150	190	S
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	72	75	U
Safran-Riesenschirmling	<i>Chlorophyllum olivieri</i>	1,9	160	S
Schmalblättriger Weißstäubling	<i>Russula chloroides</i>	17	120	S
Ziegelgelber Schleimkopf	<i>Cortinarius varius</i>	70	210	S
Zwiebelfüßiger Hallimasch	<i>Armillaria cepistipes</i>	2,5	230	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Brauner Büschelrasling	<i>Lyophyllum decastes</i>	0,6	90	S
		6,9	75	
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	110	150	U
Butterrübbling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	0,4	62	S
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	5,1	120	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	2,2	78	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	30	93	G-§
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,5	68	S
Flockenstieleriger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	16	51	S
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	3,5	89	S
Fuchsiger Rötelritterling	<i>Lepista flaccida</i>	0,3	130	U
Gelbstieliger Muschelseitling	<i>Panellus serotinus</i>	9,2	64	U
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	2,7	130	S
Goldröhrling	<i>Suillus grevillei</i>	130	95	S
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	10	51	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	1,3	140	S
Hasenröhrling	<i>Gyroporus castaneus</i>	1,0	170	G-RL G
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	0,9	170	U
Krause Glucke, Fette Henne	<i>Sparassis crispa</i>	80	64	S
Kuhmaul	<i>Gomphidius glutinosus</i>	12	69	S
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	0,7	92	U
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	8,8	53	S
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	52	80	U
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	1,6	340	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	1,2	79	S
		8,3	97	
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	4,1	140	S
Riesenporling	<i>Meripilus giganteus</i>	0,3	78	S
Samtfußkrempling	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	0,5	23	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Schiefknolliger Anischampignon	<i>Agaricus essettei</i>	0,7	140	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	4,9	82	S
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	36	99	S
Violetter Rötelritterling	<i>Lepista nuda</i>	3,0	74	S
Violettstieliger Pfirsichtäubling	<i>Russula violeipes</i>	3,6	13	S
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	0,4	170	U
Wässriger Saumpilz	<i>Psathyrella piluliformis</i>	0,5	97	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	4,5	76	U
Blassblauer Rötleritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	43	68	S
Blauer Träuschling	<i>Stropharia caerulea</i>	19	75	U
		5,5	56	
Breitblättrige Glucke (Tannenglucke)	<i>Sparassis brevipes</i>	20	57	S
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	15	180	U
Buckeltäubling	<i>Russula caerulea</i>	27	120	U
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	88	150	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	28	110	U
		54	160	
Duftender Leistling	<i>Craterellus lutescens</i>	46	340	G-§
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	0,7	320	U
		14	380	
		4,1	120	
Faltentintling	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	1,0	53	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	18	200	S
		79	170	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,5	80	S
		2,3	91	
Flockenstieler Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	43	140	S
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	56	150	S
		74	130	
Gelbstieliger Muschelseitling	<i>Panellus serotinus</i>	11	41	U
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	3,3	130	S
		4,8	110	
Goldröhrling	<i>Suillus grevillei</i>	210	130	S
		240	170	
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	28	55	S
		100	87	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Grauer Lärchenröhrling	<i>Suillus viscidus</i>	280	410	S
		390	140	
		7,6	52	
Grauer Leistling	<i>Cantharellus cinereus</i>	18	38	G-§ RL 3
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	4,8	230	S
		9,7	210	
Hainbuchen-Raufuß	<i>Leccinum pseudoscabrum</i>	38	160	G-§
		150	260	
Horngrauer Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea f. asema</i>	0,9	53	S
		1,0	66	
Judasohr	<i>Auricularia auricula-judae</i>	1,4	13	S
Kaffeebrauner Gabeltrichterling	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	2,2	59	S
		5,5	59	
Knopfstieliger Rübling	<i>Gymnopus confluens</i>	4,9	560	U
Kurzstieliger Weichritterling	<i>Melanoleuca brevipes</i>	0,6	49	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Lachsblättriger Schwarztaubling	<i>Russula anthracina</i>	4,9	190	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	20	67	S
Lärchenmilchling	<i>Lactarius porninsis</i>	68	140	S
Lärchen-Schneckling	<i>Hygrophorus lucorum</i>	520	60	S
Lederstieltaubling	<i>Russula viscida</i>	5,0	94	G-RL V
		6,2	220	
		24	150	
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	38	56	S
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	22	78	S
		27	90	
Mönchskopf	<i>Infundibulicybe geotropa</i>	0,3	180	S
		0,5	69	
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	1,4	62	U
		2,9	51	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	16	110	S
		18	160	
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	36	85	U
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	8,6	250	S
		9,1	140	
Pfefferröhrling	<i>Chalciporus piperatus</i>	3,9	43	U
Punktierstieliger Schneckling	<i>Hygrophorus pustulatus</i>	130	67	S
		350	110	
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	56	48	S
Rostroter Lärchenröhrling	<i>Suillus tridentinus</i>	280	120	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	390	280	S
		680	330	
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	3,0	92	U
		210	140	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rotstieliger Ledertäubling	<i>Russula olivacea</i>	2,1	67	U
		2,3	220	
		4,2	230	
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,4	110	S
		0,9	64	
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	590	120	S
Sommersteinpilz	<i>Boletus reticulatus</i>	14	99	G-RL G
		91	93	
Speise-Täubling	<i>Russula vesca</i>	42	260	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	4,2	66	S
		79	170	
Veilchenrötleritterling	<i>Lepista irina</i>	0,3	40	S
Violetter Rötleritterling	<i>Lepista nuda</i>	21	43	S
		7,8	84	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Waldfreundröbling	<i>Gymnopus dryophilus</i>	0,4	51	U
		3,4	180	
Ziegenlippe	<i>Xerocomus subtomentosus</i>	5,6	230	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Anisklumpfuß	<i>Cortinarius odorifer</i>	8,9	79	U
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	40	110	S
Blassblauer Rötelritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	1100	200	S
Blauer Träuschling	<i>Stropharia caerulea</i>	25	26	U
Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	0,7	38	S
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	220	63	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	170	110	U
Duftender Leistling	<i>Craterellus lutescens</i>	370	610	G-§
Dunkelscheibiger Schneckling	<i>Hygrophorus discoideus</i>	550	48	S
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	20	79	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	32	45	S
		65	120	
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	140	100	S
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	76	68	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	35	59	G-RL 3
		210	220	
Isabellfarbener Schneckling	<i>Hygrophorus poetarum</i>	910	84	S
Körnchenröhrling	<i>Suillus granulatus</i>	140	100	U
Kuhmaul	<i>Gomphidius glutinosus</i>	82	53	S
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	29	63	S
		82	170	
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	11	42	S
Lederstieltäubling	<i>Russula viscida</i>	180	250	G-RL V
Mausgrauer Erdritterling	<i>Tricholoma myomyces</i>	550	110	U
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	20	74	S
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	180	37	U
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	81	86	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	100	170	S
Pfifferling	<i>Cantharellus cibarius</i>	460	300	G-§

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	230	52	U
Sommersteinpilz	<i>Boletus reticulatus</i>	99	140	G-RL G
Violetter Schleierling	<i>Cortinarius violaceus</i>	320	140	S
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	10	250	U
Ziegelgelber Schleimkopf	<i>Cortinarius varius</i>	8,4	96	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Austernseitling	<i>Pleurotus ostreatus</i>	23	68	S
Blaublättriger Schleimfuß	<i>Cortinarius delibutus</i>	500	71	U
Blaustiel-Schleimfuß	<i>Cortinarius muscigenus</i>	750	170	G-RL G
Breitblättrige Glucke (Tannenglucke)	<i>Sparassis brevipes</i>	46	62	S
		150	190	
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	74	82	U
		160	99	
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	660	88	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	360	80	U
		730	100	
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	17	190	U
Düsterer Porphyrröhrling	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	570	150	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	19	100	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	74	82	G-§
Flockenstieler Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	120	84	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	250	130	S
Gemeiner Birkenpilz	<i>Leccinum scabrum s.l.</i>	200	120	G-§
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	630	170	S
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	74	140	S
		250	110	
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	4,7	120	U
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	1200	91	S
		1400	170	
Mohrenkopfmilchling	<i>Lactarius lignyotus</i>	460	190	G-RL 3
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	340	120	U
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	150	88	S
		170	81	
Pfifferling	<i>Cantharellus cibarius</i>	150	180	G-§
		520	240	
Rotbrauner Scheidenstreifling	<i>Amanita fulva</i>	800	240	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	4400	210	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	9,9	210	S
Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	640	140	G-§
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	140	160	S
		640	200	
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	18	150	U
Wolliger Milchling	<i>Lactifluus vellereus</i>	47	100	U
Zitterzahn	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	2,4	37	S
Zweifarbiger Scheidenstreifling	<i>Amanita umbrinolutea</i>	120	260	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM).

Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Amethystpfifferling	<i>Cantharellus amethysteus</i>	9,0	270	G-§
Ästiger Stachelbart	<i>Hericium coralloides</i>	4,7	120	G-RL G
Austernseitling	<i>Pleurotus ostreatus</i>	120	120	S
Breitblättrige Glucke (Tannenglucke)	<i>Sparassis brevipes</i>	42	160	S
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	150	120	U
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	140	110	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	270	160	U
		1200	83	
Düsterer Porphyrröhrling	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	99	230	U
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	52	120	G-§
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	88	110	G-§
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	300	140	S
		450	120	S
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	17	130	S
		46	150	
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	91	170	G-RL 3

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	220	80	S
Lungen-Seitling	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	35	91	S
Mohrenkopfmilchling	<i>Lactarius lignyotus</i>	370	240	G-RL 3
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	64	110	S
		150	180	
Pfifferling	<i>Cantharellus cibarius</i>	110	180	G-§
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	200	120	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	370	140	S
Schwefelporling	<i>Laetiporus sulphureus</i>	27	140	U
Seidiger Ritterling	<i>Tricholoma columbetta</i>	1400	97	S
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	660	180	S
		1800	150	
Speise-Täubling	<i>Russula vesca</i>	62	130	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	270	160	S
Strubbelkopfröhrling	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	170	210	U
Totentrompete	<i>Craterellus cornucopioides</i>	170	120	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2023.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Trompetenfifferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	300	110	G-§
		880	230	
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	65	200	S
Wolliger Milchling	<i>Lactifluus vellereus</i>	69	120	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Anhang: Messergebnisse des Jahres 2022

Tabelle 2022.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Braunschuppiger Riesenchampignon	<i>Agaricus augustus</i>	0,4	160	S
Buckeltäubling	<i>Russula caerulea</i>	21	82	U
		40	73	
Echter Reizker	<i>Lactarius deliciosus</i>	19	66	S
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	21	50	S
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	2,3	84	S
Flockenstieliger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	58	57	S
		60	74	
Fuchsiger Rötleritterling	<i>Lepista flaccida</i>	3,7	130	U
Knopfstieliger Rübling	<i>Gymnopus confluens</i>	3,5	67	U
		4,7	80	
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	26	110	S
Lederstieltäubling	<i>Russula viscida</i>	27	140	G-RL V
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	220	91	S
Ockerbrauner Trichterling	<i>Infundibulicybe gibba</i>	8,9	55	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	2,3	100	S
		140	100	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	62	110	S
		120	140	
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	92	86	U
Waldchampignon	<i>Agaricus sylvaticus</i>	< NWG (8,2)	160	S
Ziegelgelber Schleimkopf	<i>Cortinarius varius</i>	19	120	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Blutroter Filzröhrling	<i>Hortiboletus rubellus</i>	0,3	150	S
Brauner Büschelrasling	<i>Lyophyllum decastes</i>	3,4	62	S
Braunroter Ledertäubling	<i>Russula integra</i>	6,8	110	S
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	1,0	58	U
		1,8	69	
Dickblättriger Schwärztäubling	<i>Russula nigricans</i>	18	79	U
Echter Knoblauchschildling	<i>Mycetinis scorodonius</i>	< NWG (21)	190	S
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	2,6	160	S
Faltentintling	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	0,3	96	U
		0,5	120	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,1	71	S
Flockenstieliger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	27	51	S
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	1,8	110	S
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	0,7	75	U
		1,1	99	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Krause Glucke, Fette Henne	<i>Sparassis crispa</i>	3,9	85	S
Lärchenmilchling	<i>Lactarius porninsis</i>	0,8	89	S
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	37	98	S
Ockerbrauner Trichterling	<i>Infundibulicybe gibba</i>	0,5	59	S
		1,9	66	
Panzer-Rasling	<i>Lyophyllum decastes</i> var. <i>loricatum</i>	5,0	86	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	2,5	84	S
Purpurschwarzer Täubling	<i>Russula bresadolae</i>	0,8	100	S
		1,0	88	
Riesenporling	<i>Meripilus giganteus</i>	0,1	78	S
		1,8	68	
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	23	84	U
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata</i> s.l.	4,4	170	S
Safran-Riesenschirmling	<i>Chlorophyllum olivieri</i>	< NWG (4,3)	630	S
Schiefknolliger Anischampignon	<i>Agaricus essettei</i>	< NWG (17)	110	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Schmalblättriger Weißtäubling	<i>Russula chloroides</i>	0,6	130	S
Schmalsporiger Falten-Tintling	<i>Coprinopsis acuminata</i>	< NWG (7,5)	200	U
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,5	130	S
Stadtchampignon	<i>Agaricus bitorquis</i>	0,5	130	S
Sternschuppiger Riesenschirmling	<i>Macrolepiota konradii s.l.</i>	0,2	96	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	1,4	75	S
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	0,9	150	S
Violettstieliger Pfirsichtäubling	<i>Russula violeipes</i>	1,1	120	S
Wässriger Saumpilz	<i>Psathyrella piluliformis</i>	8,9	140	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Apfeltäubling	<i>Russula paludosa</i>	84	79	S
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	5,3	130	S
Brauner Kiefern-Blutreizker	<i>Lactarius quieticolor</i>	83	60	S
		170	80	
Braunroter Lacktrichterling	<i>Laccaria proxima</i>	3,9	140	S
Buckeltäubling	<i>Russula caerulea</i>	26	140	U
		65	83	
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	4,2	140	U
Echter Reizker	<i>Lactarius deliciosus</i>	17	62	S
		4,5	65	
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	41	80	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	130	98	G-§
Flockenstieleriger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	15	43	S
		28	52	
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	17	100	S
Gewöhnliche Wurzeltrüffel	<i>Rhizopogon vulgaris</i>	6,7	190	S
		31	90	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	22	110	S
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	380	64	G-RL 3
Jodoform-Täubling	<i>Russula turci</i>	32	140	S
Keulenfüßiger Trichterling	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	28	93	U
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	57	73	S
		140	75	
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	77	84	U
		130	83	
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	0,5	120	S
		1,3	210	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	44	110	S
Reifpilz	<i>Cortinarius caperatus</i>	310	90	S
Rostroter Lärchenröhrling	<i>Suillus tridentinus</i>	17	220	S
Rötlicher Holzritterling	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	37	150	U
Schwarzfaseriger Ritterling	<i>Tricholoma portentosum</i>	47	130	G-RL 3
Spangrüner Kiefern-Reizker	<i>Lactarius semisanguifluus</i>	220	90	G-RL 3
Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	170	100	G-§

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	70	140	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	0,5	180	U
Blassblauer Rötelritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	4,1	130	S
Blauer Träuschling	<i>Stropharia caerulea</i>	7,0	100	U
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	30	71	U
		9,4	120	
Dichtblättriger Schwarztaubling	<i>Russula densifolia</i>	23	94	S
Dickblättriger Schwarztaubling	<i>Russula nigricans</i>	15	150	U
		66	83	
		140	78	
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	2,3	350	U
		2,6	300	
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	35	150	S
		170	120	
		210	120	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	11	68	S
		26	86	
		27	56	
		9,8	130	
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	27	85	G-§
		29	52	
		68	90	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	1,2	89	S
		2,4	76	
Flockenstieleriger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	8,5	42	S
		68	50	
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	5,0	110	S
		13	100	
Gemeiner Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	120	190	S
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	10	140	S
		13	89	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	1,1	81	S
		2,9	92	
		5,1	220	
		4,5	100	
Goldröhrling	<i>Suillus grevillei</i>	93	64	S
		250	70	
Gold-Täubling	<i>Russula aurea</i>	13	140	S
Grauer Lärchenröhrling	<i>Suillus viscidus</i>	73	54	S
		86	35	
Grüner Nadelwald-Heringstäubling	<i>Russula clavipes</i>	17	110	S
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	83	90	G-RL 3
Harter Pappel-Raufußröhrling	<i>Leccinum duriusculum</i>	74	120	G-RL 3
Hohlfußröhrling	<i>Boletinus cavipes</i>	29	45	S
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	7,3	130	U
Kuhmaul	<i>Gomphidius glutinosus</i>	6,9	160	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Kuhröhrling	<i>Suillus bovinus</i>	140	63	S
		300	81	
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	16	120	S
Lachsblättriger Schwarztaubling	<i>Russula anthracina</i>	7,7	89	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	22	140	S
Lärchenmilchling	<i>Lactarius porninsis</i>	53	64	S
		90	85	
Lederstieltaubling	<i>Russula viscida</i>	4,0	140	G-RL V
		4,7	110	
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	24	77	S
		140	76	
		230	100	
		320	110	
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	8,5	120	S
		37	110	
		120	190	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Milder Glanztäubling	<i>Russula nitida</i>	15	93	S
		6,8	130	
Mönchskopf	<i>Infundibulicybe geotropa</i>	1,2	57	S
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	3,2	180	U
		4,9	93	
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	15	72	S
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	43	72	U
Panzer-Rasling	<i>Lyophyllum decastes</i> var. <i>loricatum</i>	1,6	52	S
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	0,6	110	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	100	100	S
		210	130	
		3,4	160	
Punktierstieliger Schneckling	<i>Hygrophorus pustulatus</i>	610	220	S
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	3,7	180	S
Rostbrauner Filzröhrling	<i>Xerocomus ferrugineus</i>	0,4	160	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rostroter Lärchenröhrling	<i>Suillus tridentinus</i>	52	45	S
		63	52	
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	660	150	S
		890	190	
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	4,0	120	S
		15	67	
		18	100	
Rotstieliger Ledertäubling	<i>Russula olivacea</i>	1,0	110	U
		7,0	120	
		9,5	120	
		4,9	88	
Schiefknolliger Anischampignon	<i>Agaricus essettei</i>	21	240	S
Schleiereule	<i>Cortinarius praestans</i>	17	43	G-RL V
Schmutziger Röteltrichterling	<i>Lepista sordida</i>	11	100	S
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	11	110	S
		12	100	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	61	120	S
		330	95	
Sommersteinpilz	<i>Boletus reticulatus</i>	17	54	G-RL G
Speise-Täubling	<i>Russula vesca</i>	38	120	S
Stadtchampignon	<i>Agaricus bitorquis</i>	0,5	160	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	26	60	S
Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	100	99	G-§
		830	130	
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	25	120	S
		58	240	
		100	100	
Waldchampignon	<i>Agaricus sylvaticus</i>	2,7	220	S
Waldfreundröbling	<i>Gymnopus dryophilus</i>	1,0	48	U
		10	55	
Wohlriechender Schneckling	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	120	130	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Zitterzahn	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	3,8	17	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Anisklumpfuß	<i>Cortinarius odorifer</i>	190	42	U
		260	71	
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	18	45	U
Blassblauer Rötelritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	240	78	S
Blaublättriger Schleimfuß	<i>Cortinarius delibutus</i>	100	96	U
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	2,1	94	U
Dichtblättriger Schwarztäubling	<i>Russula densifolia</i>	35	170	S
		270	69	
Duftender Leistling	<i>Craterellus lutescens</i>	120	81	G-§
		130	130	
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	28	270	U
Echter Reizker	<i>Lactarius deliciosus</i>	53	95	S
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	800	210	S
		2100	130	
Faltentintling	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	56	100	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	34	53	S
		99	130	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	1,9	82	S
Fleischroter Gallertrichterling	<i>Tremiscus helvelloides</i>	44	18	G – RL G
Goldröhrling	<i>Suillus grevillei</i>	160	50	S
		200	94	
Grauer Lärchenröhrling	<i>Suillus viscidus</i>	95	35	S
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	110	110	G-RL 3
		320	230	
Isabellfarbener Schneckling	<i>Hygrophorus poetarum</i>	120	90	S
Körnchenröhrling	<i>Suillus granulatus</i>	87	35	U
Kuhröhrling	<i>Suillus bovinus</i>	33	26	S
		60	33	
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	39	64	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	6,6	54	S
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	30	79	S
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	19	25	S
Olivbrauner Milchling	<i>Lactarius turpis</i>	27	59	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rosenroter Schmierling	<i>Gomphidius roseus</i>	190	110	S
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	920	210	S
Violetter Schleierling	<i>Cortinarius violaceus</i>	180	77	S
Violettertrandiger Schleimkopf	<i>Phlegmacium balteatum</i>	28	33	U
Waldfreundröbling	<i>Gymnopus dryophilus</i>	22	99	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	520	70	S
		670	110	
Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	16	120	S
Dickblättriger Schwartzäubling	<i>Russula nigricans</i>	170	53	U
		550	77	
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	13	92	U
		160	110	
Düsterer Porphyrröhrling	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	90	80	U
Falscher Pfifferling	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	42	61	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	10	67	S
		54	69	
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	160	55	G-§
Flockenstieliger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	71	42	S
		74	40	
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	500	92	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	48	53	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	1000	110	S
		1100	72	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	56	85	S
		150	77	
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	13	160	S
Rotbrauner Scheidenstreifling	<i>Amanita fulva</i>	480	140	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	3000	130	S
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	970	120	S
Speise-Täubling	<i>Russula vesca</i>	360	120	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	180	65	S
Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	810	97	G-§
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	110	88	S
		130	85	
Ziegenlippe	<i>Xerocomus subtomentosus</i>	250	73	S
Zitterzahn	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	21	38	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

**Tabelle 2022.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM).
Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.**

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Ästiger Stachelbart	<i>Hericum coralloides</i>	42	120	G-RL G
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	230	91	S
		540	120	
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	59	91	U
		99	100	
Butterrübbling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	13	90	S
Dickblättriger Schwärtzäubling	<i>Russula nigricans</i>	230	190	U
Düsterer Porphyrröhrling	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	40	120	U
Echter Knoblauchschildling	<i>Mycetinis scorodonius</i>	36	190	S
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	730	120	S
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	42	100	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	71	46	G-§
		130	73	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	2,3	91	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Flockenstieliger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	170	49	S
		180	51	
Gemeiner Birkenpilz	<i>Leccinum scabrum s.l.</i>	15	78	G-§
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	340	88	S
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	1,5	110	S
Grasgrüner Birken- Täubling	<i>Russula aeruginea</i>	56	190	S
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	50	160	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	120	68	S
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	340	58	S
		610	73	
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	80	94	S
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	650	100	U
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	85	100	S
		130	65	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2022.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	70	120	S
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	340	190	S
Schmalblättriger Weißstäubling	<i>Russula chloroides</i>	12	130	S
Schwefelporling	<i>Laetiporus sulphureus</i>	4,4	28	U
Seidiger Ritterling	<i>Tricholoma columbetta</i>	430	99	S
		630	160	
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	1000	95	S
		2100	120	
Trockener Schneckling	<i>Hygrophorus penarius</i>	160	110	S
		320	120	
Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	540	150	G-§
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	77	100	S
		130	100	
Violetter Schleierling	<i>Cortinarius violaceus</i>	220	77	S
Ziegenlippe	<i>Xerocomus subtomentosus</i>	600	190	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Anhang: Messergebnisse des Jahres 2021

Tabelle 2021.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Amethystpfifferling	<i>Cantharellus amethysteus</i>	50	110	G-§
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	91	190	S
Brauner Büschelrasling	<i>Lyophyllum decastes</i>	21	100	S
		120	130	
Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	17	160	S
Dickblättriger Schwartzäubling	<i>Russula nigricans</i>	190	74	U
		350	84	
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	49	82	G-§
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	250	88	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	64	110	G-§
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,9	80	S
		5,3	75	
Fleischroter Gallertrichterling	<i>Tremiscus helvelloides</i>	4,3	21	G – RL G
		140	65	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Flockenstieler Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	41	60	S
		46	55	
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	24	120	S
Fuchsiger Rötelritterling	<i>Lepista flaccida</i>	12	120	U
Gelbstieliger Trompetenpfefferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i> <i>var. lutescens</i>	190	95	G-§
		530	200	
Gemeiner Birkenpilz	<i>Leccinum scabrum s.l.</i>	20	62	G-§
		40	92	
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> <i>ss. str. agg.</i>	400	160	S
Grauer Scheidenstreifling	<i>Amanita vaginata</i>	13	70	S
Habichtspilz	<i>Sarcodon imbricatus</i>	280	170	G-RL 3
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	22	130	S
Lederstieltäubling	<i>Russula viscida</i>	13	120	G-RL V
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	370	120	S
		410	110	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	43	100	U
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	340	100	U
		340	110	
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	6,7	190	S
		15	140	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	69	170	S
		190	120	
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	1500	230	S
		760	150	
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	160	120	S
Safran-Riesenschirmling	<i>Chlorophyllum olivieri</i>	9,9	170	S
		7,6	150	
Samtfußkrempling	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	110	56	U
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,7	120	S
		1,0	83	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	80	100	S
		380	210	
Violetter Rötelritterling	<i>Lepista nuda</i>	9,5	83	S
Violetter Schleierling	<i>Cortinarius violaceus</i>	310	140	S
		330	100	
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	61	130	U
Ziegelgelber Schleimkopf	<i>Cortinarius varius</i>	14	150	S
Zystiden-Räsling	<i>Clitopilus cystidiatus</i>	22	240	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Buckeltäubling	<i>Russula caerulea</i>	21	140	U
		41	120	
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	32	120	S
		44	86	
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	72	96	G-§
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	5,8	130	S
Flockenstieler Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	54	68	S
Fuchsiges Rötleritterling	<i>Lepista flaccida</i>	2,6	120	U
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	420	100	S
Parasol / Riesenschirmpilz	<i>Macrolepiota procera</i>	3,0	110	S
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	240	110	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	300	140	S
Safran-Riesenschirmling	<i>Chlorophyllum olivieri</i>	2,9	140	S
Veilchenrötleritterling	<i>Lepista irina</i>	54	160	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Amethystpfifferling	<i>Cantharellus amethysteus</i>	2,5	600	G-§
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	0,9	61	U
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	1,0	120	U
		9,6	58	
Dickblättriger Schwärtztaubling	<i>Russula nigricans</i>	18	85	U
		23	86	
Faltentintling	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	3,0	130	U
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,5	72	S
		6,8	110	
Flockenstieleriger Hexenröhrling	<i>Neoboletus erythropus</i>	9,4	57	S
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	18	110	S
Gelbstieliger Trompetenpfifferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i> <i>var. lutescens</i>	130	150	G-§
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> <i>ss. str. agg.</i>	2,2	130	S
		4,9	160	
Jodoform-Täubling	<i>Russula turci</i>	10	110	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Knopfstieliger Rübbling	<i>Gymnopus confluens</i>	3,4	120	U
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	210	120	S
		300	170	
Milder Milchling	<i>Lactarius aurantiacus</i>	32	98	S
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	37	130	U
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	15	140	S
		44	140	
Purpurschwarzer Täubling	<i>Russula bresadolae</i>	1,4	110	S
		1,6	150	
Safran-Riesenschirmling	<i>Chlorophyllum olivieri</i>	0,6	160	S
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,05	96	S
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	7,1	110	S
Strubbelkopfröhrling	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	9,2	190	U
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	88	260	S
Violetter Schleierling	<i>Cortinarius violaceus</i>	51	110	S
Zweifarbiger Scheidenstreifling	<i>Amanita umbrinolutea</i>	2,9	250	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	0,3	33	U
		2,7	79	
		2,8	56	
Blassblauer Rötleritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	67	86	S
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	1,9	48	U
Dickblättriger Schwärtzäubling	<i>Russula nigricans</i>	3,0	140	U
		40	59	
Dunkelscheibiger Schneckling	<i>Hygrophorus discoideus</i>	730	170	S
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	12	540	U
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	690	320	S
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	10	71	G-§
Faltentintling	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	0,3	120	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	11	46	S
		47	75	
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	86	79	G-§
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	0,6	92	S
		9,9	140	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Fleischroter Gallertrichterling	<i>Tremiscus helvelloides</i>	13	45	G – RL G
Gelbstieliger Muschelseitling	<i>Panellus serotinus</i>	19	130	U
Gelbstieliger Trompetenfifferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i> <i>var. lutescens</i>	620	120	G-§
Gemeiner Birkenpilz	<i>Leccinum scabrum s.l.</i>	18	160	G-§
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> <i>ss. str. agg.</i>	6,3	150	S
		310	180	
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	0,5	110	S
Goldröhrling	<i>Suillus grevillei</i>	240	140	S
Graublättriger Erdritterling	<i>Tricholoma terreum</i>	260	240	U
		270	100	
Graublättriger Schwefelkopf	<i>Hypholoma capnoides</i>	67	190	S
Hohlfußröhrling	<i>Boletinus cavipes</i>	560	220	S
Honiggelber Hallimasch	<i>Armillaria mellea s.l.</i>	3,9	89	U
Horngrauer Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea f.</i> <i>asema</i>	14	180	S
Judasohr	<i>Auricularia auricula-judae</i>	4,0	63	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Kurzstieler Weichritterling	<i>Melanoleuca brevipes</i>	1,1	82	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	14	65	S
		31	48	
Lärchen-Schneckling	<i>Hygrophorus lucorum</i>	470	200	S
Lederstieltäubling	<i>Russula viscida</i>	0,9	120	G-RL V
		4,7	140	
		17	120	
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	210	78	S
		300	200	
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	11	130	S
Mehlräsling-Aggregat	<i>Clitopilus prunulus agg.</i>	150	670	S
Mohrenkopfmilchling	<i>Lactarius lignyotus</i>	33	130	G-RL 3
Mönchskopf	<i>Infundibulicybe geotropa</i>	0,9	150	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	1,1	150	U
		1,5	120	
		4,8	67	
		27	95	
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	130	96	U
		160	110	
Orangegelber Lärchen- Schneckling	<i>Hygrophorus speciosus</i>	590	250	S
Punktierstieliger Schneckling	<i>Hygrophorus pustulatus</i>	420	180	S
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	2,8	210	S
		41	240	
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	320	150	S
		360	170	
		2600	270	
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	5,8	300	S
		40	180	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Rotstieliger Ledertäubling	<i>Russula olivacea</i>	10	240	U
Samtfußkrempling	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	290	65	U
Schmutziger Röteltrichterling	<i>Lepista sordida</i>	28	180	S
Schopftintling	<i>Coprinus comatus</i>	0,2	59	S
		1,5	120	
Schwarzfaseriger Ritterling	<i>Tricholoma portentosum</i>	66	180	G-RL 3
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	160	110	S
		810	130	
Speise-Täubling	<i>Russula vesca</i>	630	200	S
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	18	170	S
Violetter Rötelritterling	<i>Lepista nuda</i>	6,7	220	S
Waldfreundrübling	<i>Gymnopus dryophilus</i>	0,3	42	U
Weißer Büschelrasling	<i>Leucocybe connata</i>	1,7	110	U
Würziger Tellerling	<i>Rhodocybe gemina</i>	0,5	100	S
Ziegelgelber Schleimkopf	<i>Cortinarius varius</i>	18	160	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM).

Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Anisklumpfuß	<i>Cortinarius odorifer</i>	53	120	U
Beutelstäubling	<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	5,5	180	S
Birnenstäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	1,3	57	U
Blassblauer Rötelritterling	<i>Lepista glaucocana</i>	120	110	S
		180	76	
Dickblättriger Schwartztäubling	<i>Russula nigricans</i>	600	90	U
Dunkelscheibiger Schneckling	<i>Hygrophorus discoideus</i>	610	220	S
Elfenbeinschneckling	<i>Hygrophorus eburneus</i>	1500	300	S
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	35	82	S
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	6,5	150	S
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	52	96	S
Graublättriger Erdritterling	<i>Tricholoma terreum</i>	600	160	U
Grauer Lärchenröhrling	<i>Suillus viscidus</i>	81	34	S
Honiggelber Hallimasch	<i>Armillaria mellea s.l.</i>	5,9	130	U
Kuhröhrling	<i>Suillus bovinus</i>	27	37	S
		100	160	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Kupferroter Gelbfuß	<i>Chroogomphus rutilus</i>	53	140	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	35	57	S
Lärchen-Schneckling	<i>Hygrophorus lucorum</i>	1500	170	S
Mausgrauer Erdritterling	<i>Tricholoma myomyces</i>	180	190	U
Mehlräsling	<i>Clitopilus prunulus</i>	36	90	S
Netzstieliger Hexenröhrling	<i>Suillellus luridus</i>	35	57	S
Rostroter Lärchenröhrling	<i>Suillus tridentinus</i>	500	110	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	1800	260	S
Roter Heringstäubling	<i>Russula xerampelina</i>	80	92	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Amethystpfifferling	<i>Cantharellus amethysteus</i>	51	370	G-§
Bereifter Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	520	110	S
Blaustiel-Schleimfuß	<i>Cortinarius muscigenus</i>	250	160	G-RL G
Butterrübling	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	71	140	S
Dickblättriger Schwärztäubling	<i>Russula nigricans</i>	580	98	U
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	21	130	U
Fichtenreizker	<i>Lactarius deterrimus</i>	16	85	S
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	150	48	G-§
		190	68	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	6,0	110	S
Gelbstieliger Trompetenpfifferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i> <i>var. lutescens</i>	1600	110	G-§
		2000	180	
Gemeiner Rotfußröhrling	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> <i>ss. str. agg.</i>	560	150	S
		840	84	
Gemeiner Weißtäubling	<i>Russula delica</i>	38	120	S
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	61	240	S
Jodoform-Täubling	<i>Russula turci</i>	210	180	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	120	120	S
Maronenröhrling	<i>Imleria badia</i>	1500	110	S
		1800	110	
Mohrenkopfmilchling	<i>Lactarius lignyotus</i>	860	180	G-RL 3
Nebeltrichterling, Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	13	130	U
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	400	130	U
		480	260	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	95	92	S
		140	95	
Rotbrauner Scheidenstreifling	<i>Amanita fulva</i>	1500	150	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	360	270	S
Rötlicher Lacktrichterling	<i>Laccaria laccata s.l.</i>	8,6	200	S
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	2100	190	S
		6100	120	
Stockschwämmchen	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	5,0	73	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	390	140	S
		530	130	
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	190	130	U

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM).

Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Amethystpfifferling	<i>Cantharellus amethysteus</i>	55	400	G-§
		150	180	
Breitblättrige Glucke (Tannenglucke)	<i>Sparassis brevipes</i>	12	110	S
Breitblättriger Rübbling	<i>Megacollybia platyphylla</i>	47	130	U
Dunkler Hallimasch	<i>Armillaria ostoyae</i>	92	150	U
Espen-Rotkappe	<i>Leccinum leucopodium</i>	160	180	G-§
Fichtensteinpilz	<i>Boletus edulis</i>	190	79	G-§
		200	70	
Flaschenstäubling	<i>Lycoperdon perlatum</i>	19	150	S
Frauentäubling	<i>Russula cyanoxantha</i>	710	200	S
Gelbstieliger Trompetenpfifferling	<i>Cantharellus tubaeformis</i> <i>var. lutescens</i>	460	80	G-§
		490	120	
Grauer Wulstling	<i>Amanita excelsa</i>	37	190	S
Lachsreizker	<i>Lactarius salmonicolor</i>	90	64	S
		590	120	

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Tabelle 2021.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Cs-137 (Bq/kg FM)	K-40 (Bq/kg FM)	Pilz-Einstufung
Ockertäubling	<i>Russula ochroleuca</i>	820	170	U
		860	160	
Perlpilz	<i>Amanita rubescens</i>	85	71	S
		95	180	
Riesenporling	<i>Meripilus giganteus</i>	3,9	110	S
Rotbrauner Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum rufescens</i>	700	200	S
Samt-Pfifferling	<i>Cantharellus friesii</i>	24	240	G-§, RL G
Semmelstoppelpilz	<i>Hydnum repandum</i>	990	130	S
		1900	160	
		2100	160	
Strubbelkopfröhrling	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	190	170	U
Totentrompete	<i>Craterellus cornucopioides</i>	700	170	S
Violetter Lacktrichterling	<i>Laccaria amethystina</i>	240	200	S
Wandelbarer Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	36	91	U
Wolliger Milchling	<i>Lactifluus vellereus</i>	140	110	U
Ziegenlippe	<i>Xerocomus subtomentosus</i>	27	580	S

S - Speisepilze

G - geschützte und gefährdete Speisepilzarten

U - uneinheitlich beurteilte Speisepilzarten

Abkürzungsverzeichnis

BArtSchV	Bundesartenschutzverordnung
BfN	Bundesamt für Naturschutz
BfS	Bundesamt für Strahlenschutz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
Cs-137	Cäsium-137
DGfM	Deutsche Gesellschaft für Mykologie e. V.
FM	Frischmasse
ICRP	International Commission on Radiological Protection (Internationale Strahlenschutzkommission)
K-40	Kalium-40

Abbildungsverzeichnis

1 Probenahmeorte im Rahmen des Pilzmessprogramms von 2020 bis heute: 1: Hochstadt; 2: Oberschleißheim; 3: Freising; 4: Siegenburg; 5: Aufham/Högl bei Anger; 6: Schneizlreuth/Oberjettenberg; 7: Bayerisch Eisenstein; 8: Zwieseler Waldhaus/Nationalpark Bayerischer Wald.....	8
2 Maronenröhrling (<i>Imleria badia</i> , links) und Parasol / Riesenschirmpilz (<i>Macrolepiota procera</i> , rechts).....	9
3 Kleingeschnittene frische Pilzproben im Trockenschrank kurz vor der Trocknung.	9
4 Reinstgermanium-Detektor mit getrockneter und gemahlener Pilzprobe für die gammaspektrometrische Messung von Cs-137.....	10
5 Schematische Darstellung der Probenvorbereitung, Messung und Auswertung.	11
6 Zeitlicher Verlauf der Cs-137-Kontamination von Maronenröhrlingen (<i>Imleria badia</i>) und Ockertäublingen (<i>Russula ochroleuca</i>) bezogen auf den Probenahmezeitpunkt und die Frischmasse (FM) für den Standort Hochstadt.....	13
7 Bodenkontamination mit Cs-137 im Jahr 1986.	15
8 Variabilität der Kontamination von Semmelstoppelpilzen (<i>Hydnum repandum</i>) am Standort Aufham im Zeitraum 2017 bis 2023.	16
9 Zeitlicher Verlauf der Ganzkörperaktivitäten (Cs-137) zweier Personen mit durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten und gelegentlichem Pilzverzehr (INKORPORATIONSMESSSTELLE 2020). Einzelheiten sind im Text beschrieben.	19
10 Spezifische Aktivitäten höher kontaminierter Wildpilze (als Jahresmittelwerte) an den Standorten Aufham/Högl und Oberjettenberg während der letzten neun Jahre (2015 bis 2023).....	22
11 Probenahmeorte der Maronenröhrlinge (<i>Imleria badia</i>) mit der jeweiligen Cs-137-Kontamination in Bq/kg FM. Probenahmeorte von Nord nach Süd: Bayerisch Eisenstein, Oberfrauenau, Frauenau, Zimmerau, Schönanger, Hintberg und Lalling.	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Funde einzelner Pilzarten an den ausgewählten Probenahmeorten im Zeitraum 2021 bis 2023 .	25
Tabelle 2: Einstufung der Speisepilzarten.	36
Tabelle 2023.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	39
Tabelle 2023.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	40
Tabelle 2023.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	41
Tabelle 2023.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	42
Tabelle 2023.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	43
Tabelle 2023.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.....	44
Tabelle 2023.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.....	45
Tabelle 2023.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	46
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	47
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	48
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart	

bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	49
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	50
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	51
Tabelle 2023.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	52
Tabelle 2023.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	53
Tabelle 2023.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	54
Tabelle 2023.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	55
Tabelle 2023.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	56
Tabelle 2023.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	57
Tabelle 2023.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	58
Tabelle 2023.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	59
Tabelle 2023.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse	

(FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	60
Tabelle 2023.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2023 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	61
Tabelle 2022.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	62
Tabelle 2022.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	63
Tabelle 2022.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	64
Tabelle 2022.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.....	65
Tabelle 2022.2 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.....	66
Tabelle 2022.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	67
Tabelle 2022.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	68
Tabelle 2022.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Siegenburg (Ort 4 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	69
Tabelle 2022.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	70
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	71

Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	72
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	73
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	74
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	75
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	76
Tabelle 2022.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	77
Tabelle 2022.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	78
Tabelle 2022.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	79
Tabelle 2022.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	80
Tabelle 2022.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	81
Tabelle 2022.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	82

Tabelle 2022.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	83
Tabelle 2022.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	84
Tabelle 2022.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2022 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	85
Tabelle 2021.1: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	86
Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	87
Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	88
Tabelle 2021.1 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Hochstadt (Ort 1 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	89
Tabelle 2021.2: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Oberschleißheim (Ort 2 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	90
Tabelle 2021.3: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	91
Tabelle 2021.3 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Freising (Ort 3 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.....	92
Tabelle 2021.4: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde...	93
Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart	

bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	94
Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	95
Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	96
Tabelle 2021.4 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Aufham/Högl (Ort 5 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	97
Tabelle 2021.5: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	98
Tabelle 2021.5 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Schneizlreuth/Oberjettenberg (Ort 6 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	99
Tabelle 2021.6: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	100
Tabelle 2021.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	101
Tabelle 2021.6 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Bayerisch Eisenstein (Ort 7 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	102
Tabelle 2021.7: Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	103
Tabelle 2021.7 (Fortsetzung): Gehalt von Cs-137 und K-40 in Speisepilzen am Probenahmeort Zwieseler Waldhaus / Nationalpark Bayerischer Wald (Ort 8 in Abb. 1) im Jahr 2021 in Bq/kg Frischmasse (FM). Mehrfacheinträge bei einer Pilzart bedeuten, dass die betreffende Spezies im jeweiligen Kalenderjahr zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden wurde.	104